

Reconstituyentes

Adedrikel® 300 es una solución a base de Vitaminas A, D3 y E con efecto reconstituyente y estimulante del Sistema Inmune para la prevención de enfermedades carenciales y mejorar el rendimiento productivo en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Especies:





ESCANEA



Más información obre este producto





Presentación: Frasco de 100 ml

Beneficios de ADEDRIKEL® 300

Su excipiente hidromiscible, su fuente de Vitamina A (Palmitato) y alta concentración de Vit D.

- La solución de Vitaminas A, D3 y E de fácil aplicación.
- La fuente de vitamina A de mayor rendimiento (Palmitato).
- Sin efectos colaterales en el sitio de aplicación.







Reconstituyentes

NÚMERO DE REGISTRO Q-1168-018

Presentación: Frasco de 100 ml

Es un reconstituyente a base de Vitaminas A, D3 y E en solución hidromiscible inyectable, con efecto estimulante del metabolismo y del Sistema Inmune de bovinos, porcinos y pequeños rumiantes.

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene: Vitamina A 300 000 IU Vitamina D3 100 000 IU Vitamina E 50 mg Vehículo cbp 1.0 ml

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

La vitamina A, es importante para el crecimiento normal y el desarrollo de los huesos, tejido epitelial sano, desarrollo embrionario, reproducción, inmunidad y la creación y maduración de eritrocitos.

La vitamina D participa, en combinación con las homonas Tirodea y Paratiroidea (Tirocalcitonina y PTH), en el metabolismo del Calcio y Fósforo. También es importante como estimulante del Sistema Inmune.

La vitamina E es un nutriente esencial para los animales ya que no se sintetiza en el organismo. La vitamina E es un antioxidante intracelular, que evita o previene el envejecimiento celular, lo que favorece la actividad del Sistema

INDICACIONES

Como estimulante del metabolismo y del Sistema Inmune, para estimular el metabolismo de Ca y P, para el desarrollo óseo de becerros en crecimiento y para estimular la actividad reproductiva en bovinos adultos.

Para el manejo de condiciones como: hipovitaminosis, estados de estrés, retraso en el crecimiento, convalecencia postinfecciosa, trastornos nutricionales del crecimiento, distrofia muscular, Raquitismo y Osteomalacia.

Para la prevención y el tratamiento de deficiencias de vitamina A, D3 y E.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

· No usar por vía intravenosa.

· Almacenar en un lugar seco, en su empaque original a temperatura menor a 30°C, protegido de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.

Dosis y modo de administración

Bovinos adultos y equinos:

Aplicar 1 ml / 100 kg vía IM o SC y repetir después de 3 -6 meses.

Terneros, potrillos y corderos:

Aplicar 1 ml / 50 kg de peso corporal vía IM o SC y repetir después de 3 - 6 meses.

Ovinos y caprinos:

Aplicar 1 ml / 75 kg de peso corporal y repetir después de 3 - 6 meses.

Caninos:

Aplicar 0.1 ml / 5 kg de peso corporal IM o SC y repetir 3-6 meses.

Tiempo de retiro:

No requiere periodo de retiro.