

อเม็อกซีเซล 15% แอล.เอ.

Amoxykel 15% L.A.      


ยาปฏิชีวนะแบบฉีดชนิดแขวนตะกอน

ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร

 **kela**
focus on health

อเม็อกซีซิลลิน ไตรไฮเดรต เทียบเท่ากับ 150 มิลลิกรัมของ Amoxicillin
Amoxicillin 150 mg/ml

- ✓ เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้าง
- ✓ ประสิทธิภาพในการรักษาออกฤทธิ์ยาวนาน 36 ถึง 48 ชั่วโมงหลังฉีด
= เป็นชนิดออกฤทธิ์ยาวนานอย่างแท้จริง
- ✓ เนื้อยากระจายสู่น้ำเยื่ออย่างรวดเร็ว
- ✓ ความเป็นพิษต่ำมาก = ทนต่อผลข้างเคียงได้ดี
- ✓ เนื้อยาเหนียวละเอียด ไม่เหนียว ฉีดง่าย



อ็อกซีเซล 15% แอล.เอ.

Amoxykel 15% L.A.



ยาปฏิชีวนะแบบฉีดชนิดแขวนตะกอน


ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร

Amoxicillin 150 mg/ml

ข้อบ่งใช้

- สำหรับโคเนื้อ โคนม สุกร แพะ แกะ แมว สุนัข
- ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยาอ็อกซีซิลลิน

ประสิทธิภาพออกฤทธิ์ยาวนาน (Long action)



เป็นที่ทราบกันว่าสำหรับ *Pasteurella multocida* ค่า MIC เริ่มจาก 0.03 µg / ml ในสุกรและสำหรับ *Arcanobacterium pyogenes*, β - haemolytic *Streptococci* และ *Streptococcus suis* ประมาณ 90% ของสายพันธุ์มีค่า MIC \leq 0.03 µg / ml เป็นที่ชัดเจนว่า ประสิทธิภาพการรักษาโดยการฉีดครั้งเดียวได้ยาวนานมากกว่า 36 ชั่วโมง และอาจจะยาวนานถึง 48 ชั่วโมงสำหรับสายพันธุ์ที่มีความไวต่อยานี้

ควรเขย่าขวดก่อนใช้

ไม่ควรฉีดยานี้ผ่านทางเส้นเลือด

ควรใช้กระบอกและเข็มฉีดยาที่สะอาดและแห้ง

จากการศึกษา

Streptococcus suis เป็นเชื้อก่อโรคในสุกรที่ทำให้เกิดโรคในคน และสุกร รวมทั้งเป็นเชื้อแบคทีเรียสำคัญที่เป็นสาเหตุการตายของลูกสุกรหลังหย่านม การตรวจพบอาการของโรคระยะแรก รวมทั้งการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะแบบฉีดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มโอกาสรอดสูงสุดในลูกสุกร

อ็อกซีซิลลินเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจาก *Streptococcus suis Haemophilus parasuis* เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในทางเดินหายใจส่วนต้นของสุกรและเป็นสาเหตุให้เกิดโรครุนแรงที่เรียกว่าโรค Glasser disease โดย *H. parasuis* นี้เป็นหนึ่งในแบคทีเรียแกรมลบบางชนิดที่สามารถรักษาได้โดยยากลุ่มเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ การศึกษาค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อทั้งสองนี้ โดยพบว่าเชื้อไวต่อการรักษาด้วยอ็อกซีซิลลิน

S. suis

	MIC ₅₀	% of sensitive isolates	Range of MIC
Amoxicillin	< 0,125	100	\leq 0,125 - 0,5

H. parasuis

	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Range of concentration
Amoxicillin	0,06	0,25	\leq 0,03 - 4

ระยะหยุดยา :

โคเนื้อ โคนม สุกร แกะ : หยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าเพื่อบริโภค 28 วัน

โคนม : หยุดยาก่อนรีดนมเพื่อบริโภค 3 วัน

ไม่ควรใช้ในแกะที่ผลิตนมเพื่อการบริโภค

อายุสินค้า : 24 เดือนตามอายุทะเบียน (36 เดือนตามอายุสินค้า)

การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

ขนาดและวิธีการใช้

ชนิดของสัตว์	วิธีการใช้	อัตราการใช้	ความถี่ในการใช้
โคเนื้อ โคนม สุกร แกะ สุนัข แมว	โคเนื้อ โคนม สุกร แกะ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น สุนัข แมว ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือ ใต้ผิวหนัง	7.5 - 15 มิลลิกรัมของอ็อกซีซิลลินต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กก. 0.5 - 1.0 มิลลิลิตรของ Amoxykel 15% L.A. ต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กก. สามารถฉีดซ้ำหากจำเป็น	ฉีดทุก 36 - 48 ชั่วโมง



KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgium
T.+32 3 340 04 11
info@kela.health
www.kela.health

ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว



บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด

323 เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2833-8000

