

ตราช็อกกษะ-เคล

Drycloxakel



ยาสอดเต้าชนิดครีม

ขนาดบรรจุหลอด 9 กรัม ในกล่อง 20 หลอด

 **kela**  
focus on health

คลอกซาซิลลิน เบนซาทีน 1 กรัม เทียบเท่ากับคลอกซาซิลลิน 685, 1 มิลลิกรัม  
Cloxacillin benzathine 1g eq. to Cloxacillin 685,1 mg. Excipients up to 9 g

- ✓ ออกฤทธิ์ดีที่สุดต่อเชื้อที่ก่อปัญหาเต้านมอักเสบ
- ✓ เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Bactericidal)
- ✓ ความเข้มข้นระดับรักษาคงอยู่ยาวนานที่เต้านม
- ✓ การดื้อยาคต่ำ แมื่อยากระจายตัวในเต้านม



# ดรายค็อกซา-เคล Drycloxakel



ยาสอดเต้านมชนิดครีม

ขนาดบรรจุหลอด 9 กรัม ในกล่อง 20 หลอด

Cloxacillin benzathine 1g eq. to Cloxacillin 685,1 mg.



## ข้อบ่งใช้

- สำหรับป้องกันและรักษาเต้านมอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ไวต่อยาคลอกซาซิลลินช่วงพักรีดนม

## จากการศึกษา

- ระยะพักรีดนมเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของวงจรให้นมของโคนมระหว่างช่วงพักรีดนมนี้ แม่โคและเต้านมจะเตรียมความพร้อมในการให้นมช่วงต่อไป เต้านมจะติดเชื่อได้ง่ายช่วงเริ่มและช่วงสุดท้ายของระยะพักรีดนม การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดสอดเต้านมในช่วงนมแห้งจะเป็นการกำจัดโรคติดเชื่อที่เป็นอยู่และป้องกันการติดเชื่อใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกของระยะพักรีดนม
- คลอกซาซิลลินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Isoxazolyl-penicillins สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์แบคทีเรียและออกฤทธิ์ในการทำลายเชื้อ (bactericidal) เป็นส่วนใหญ่ ชอบเขตออกฤทธิ์กว้างต่อแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis, Staphylococcus aureus และ Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes และสามารถทำลายเชื้อ Staphylococci ที่ผลิตเอนไซม์ penicillinase ได้
- ด้วยสูตรเฉพาะของ ดรายค็อกซา-เคล ที่ประกอบด้วย Benzathine cloxacillin และ Aluminium monostearate ทำให้สามารถออกฤทธิ์ด้วยความเข้มข้นระดับรักษาได้ยาวนานในน้ำนมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
- ดรายค็อกซา-เคล จะถูกดูดซึมอย่างช้า ๆ จากเต้านม ดังนั้นความเข้มข้นของยาในเนื้อเยื่อร่างกาย หรือน้ำเหลืองจะอยู่ในระดับต่ำ

การป้องกันและรักษาโรคเต้านมอักเสบ

โอกาสในการดูแลรักษาเต้านมอย่างสมบูรณ์ ควรให้ยานี้ช่วงแรกของระยะพักรีดนมจะได้ผลดีกว่าการให้ยาในช่วงปลายของระยะพักรีดนม

ก่อนถึงระยะพักรีดนม ควรรีดนมให้หมด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเต้านมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หลังจากนั้นจึงฉีด

ดรายค็อกซา-เคล 1 หลอดต่อหัวนม

ครีมยาสอดเต้านมไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเต้านม แม้จะดูดซึมกระจายไปส่วนอื่น

การรักษาควรเริ่มอย่างน้อย 35 วันก่อนคลอด

ระยะหยุดยา :

โคนม : หยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าเพื่อบริโภค 28 วัน

: หยุดยาก่อนรีดนมเพื่อบริโภค 3 วัน

อายุสินค้า : 24 เดือนตามอายุทะเบียน (36 เดือนตามอายุสินค้า)

การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

: เก็บให้พ้นแสง และ ความร้อน

: เก็บให้ห่างจากเด็ก

## ขนาดและวิธีการใช้

ชนิดของสัตว์	วิธีการฉีด	อัตราการใช้	ความถี่ในการใช้
โคนม	สอดเต้านม	1 หลอดต่อ 1 หัวนม	ใช้ทันที เมื่อหมดระยะรีดนม



KELA N.V.  
Sint Lenaartseweg 48  
2320 Hoogstraten  
Belgium  
T. +32 3 340 04 11  
info@kela.health  
www.kela.health

ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว



บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด

323 เบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ถ.นิภาวดีรังสิต หลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2833-8000

