



ANTIBIÓTICO

Drycloxakel®

Ungüento intramamario

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina benzatina	1 g
Vehículo cbp	9 g

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La actividad antibacteriana de las penicilinas se basa en la inhibición de la síntesis del peptidoglicano de la red de la membrana celular. Cloxacilina inhibe la actividad de las enzimas transpeptidasa, que cataliza la reticulación de las unidades de polímero de glicopéptido que forman la pared celular con la lisis en consecuencia sólo de las células en crecimiento.

INDICACIONES:

Para el tratamiento terapéutico y profiláctico de la mastitis causada por bacterias gram-positivas sensibles a cloxacilina en vacas para el secado.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria.

Después del último ordeño (ordeño definitivo), limpiar y desinfectar los 4 cuartos.

Introducir después de la limpieza, el contenido de un inyector (= 9 g de suspensión) en cada cuarto. Todos los cuartos se deben tratar.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne y vísceras: 10 días

No utilice este producto en vacas en lactación.

ADVERTENCIAS:

Las penicilinas están contraindicadas en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a ellas. Porque puede haber reactividad cruzada, utilice penicilinas con precaución en pacientes que estén documentados hipersensibles a otros antibióticos beta-lactámicos (por ejemplo cefalosporinas, cefamicinas, carbapenemas).

PRESENTACIÓN:

20 x 9 g

REGISTRO SAGARPA:

Q-1168-019