



kela

focus on health

DRYCLOXAKEL®

- Drylicloxakel está indicado para el tratamiento terapéutico y profiláctico de la mastitis causada por bacterias gram-positivas sensibles a la Cloxacilina en vacas para el secado.



PRESENTACIÓN:

Caja con 20 jeringas de 9 gr.

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-019



Bovinos



ANTIMICROBIANOS

DRYCLOXAKEL®

Ungüento intramamario de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Cloxacilina benzatínica	1 g
Vehículo c.b.p.	9 g

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La Cloxacilina es una Penicilina semisintética resistente a la betalactamasa.

Su espectro de acción incluye bacterias Gram positivas y Gram negativas (aeróbicas y anaeróbicas) como *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus agalactiae* causantes de Mastitis Contagiosa; *Streptococcus dysgalactiae* y *Escherichia coli* causantes de Mastitis Ambiental.

El mecanismo de acción de la Cloxacilina se produce por interferencia de la síntesis del peptidoglicano, lo que inhibe la formación de la pared celular bacteriana, al desarrollar una pared celular imperfecta se provoca la lisis celular y muerte de la bacteria.

INDICACIONES:

Para la prevención de Mastitis causada por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la Cloxacilina en vacas durante el periodo seco.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Vaca en periodo seco:

Aplicar una jeringa por cada cuarto, vía intramamaria, después del último ordeño, previa limpieza y desinfección de la punta del pezón.

TIEMPO DE RETIRO:

- Carne y vísceras: **10 días**
- Leche: **10 días**

“No utilice este producto en vacas lactantes”

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.