

FLORFENIKEL 30%

- Florfenikel es un antibiótico de amplio espectro a base de Florfenicol, indicado para el manejo de infecciones de las vías respiratorias.



PRESENTACIÓN:
Frasco de 100 ml

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-017



Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos



ANTIMICROBIANOS

FLORFENIKEL 30%

Solución inyectable de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Florfenicol **300 mg**
Vehículo c.b.p. **1 ml**

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

El Florfenicol es un antimicrobiano de amplio espectro, concentración dependiente, de efecto bacteriostático y bactericida, según la dosis que se aplique.

Su espectro de acción incluye bacterias Gram negativas como *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, *Moraxella bovis*, *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

Su mecanismo de acción se produce por inhibición de la síntesis de proteínas por interacción simultánea de las subunidades 50S y 70S del ribosoma, para bloquear la actividad de la enzima Peptidil-transferasa y evitar la fase de elongación de la síntesis de proteínas.

El Florfenicol se absorbe rápido del sitio de aplicación, tiene una alta biodisponibilidad y se elimina rápidamente.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles al Florfenicol.

Bovinos:

Para el tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni*; Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina causada por *Moraxella bovis* y *Pododermatitis causada por Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

Ovinos y caprinos:

Para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*.

Porcinos:

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos:

Aplicar 1 ml/ 15 kg (20 mg de Florfenicol) vía IM repetir a las 48 horas.
Aplicar 1 ml/ 7.5 kg (40 mg de Florfenicol) vía SC dosis única.
Máximo 10 ml por sitio de aplicación.

Ovinos y caprinos:

Aplicar 1 ml/ 15 kg (20 mg de Florfenicol) vía IM repetir a las 48 horas. Máximo 4 ml por sitio de aplicación.

Porcinos:

Aplicar 1 ml/20 kg (15 mg de Florfenicol) vía IM repetir a las 48 horas. Máximo 3 ml por sitio de aplicación.

TIEMPO DE RETIRO:

- Carne

Bovinos **IM** **28 días**
 SC **35 días**

Ovinos y caprinos **28 días**

Cerdos **9 días**

- Leche **5 días**

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx
@kelaamericas