

MARBOFLOXAKEL 10%

- Marbofloxakel es un antibiótico de la familia de las quinolonas que actúa efectivamente sobre los sitios de la infección por su alta biodisponibilidad.



PRESENTACIÓN:

Frasco de 100 ml

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-021



Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos

ANTIMICROBIANOS

MARBOFLOXAKEL 10%

Solución inyectable de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Marbofloxacin
Vehículo c.b.p.

100 mg
1 ml

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

La Marbofloxacin es una quinolona, antimicrobiano sintético de efecto bactericida y amplio espectro, que actúa por interferencia del desdoblamiento y replicación de la cadena del ADN por bloqueo de la enzima ADN girasa, de esta forma evita la síntesis de proteínas y bloquea los procesos biosintéticos, de lo que deriva su efecto bactericida.

Las quinolonas, en especial la Marbofloxacin, tienen una acción específica contra *Mycoplasma spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Brucella spp.*, *Chlamydia spp.* y *Rickettsia spp.*

Su espectro de acción incluye:

Bacterias Gram negativas como: *E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, otras Enterobacterias y *Fusobacterium necrophorum*.

Bordetella bronchiseptica, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*, *Actinobacillus spp.*, *Pseudomonas spp.* y *Yersinia spp.* y otras bacterias causantes de infecciones respiratorias.

Algunas bacterias Gram positivas como: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Trueperella (Arcanobacterium/Corynebacterium) pyogenes* y *Listeria monocitogenes*.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la Marbofloxacin en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Para el tratamiento de infecciones respiratorias en ganado bovino causadas por bacterias sensibles a la Marbofloxacin, *Mycoplasma bovis*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni*.

Dado el incremento de casos de Anaplasmosis, su efecto contra bacterias causantes de Neumonía y su efecto secundario contra Rickettsias, permite su recomendación como una alternativa de tratamiento en el feedlot.

Para el tratamiento de Mastitis Ambiental (endotóxica) durante la lactancia, causada por cepas de *Escherichia coli* y otras enterobacterias sensibles a la Marbofloxacin y Pododermatitis en ganado lechero.

Para el tratamiento de problemas respiratorios en ovinos y caprinos.

Para el tratamiento de la pleuroneumonía causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y otras Infecciones respiratorias causadas por bacterias sensibles a la Marbofloxacin en cerdos.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos:

Aplicar 1 ml/ 50 kg (2 mg de Marbofloxacin) vía IM, SC o IV cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Porcinos:

Aplicar 1 ml/ 50 kg (2 mg de Marbofloxacin) vía IM cada 24 horas durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:

Carne

- Bovinos: 6 días
- Porcinos: 4 días
- Leche: 36 horas

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx
@kelaamericas