




kela

focus on health

OXYKEL 20 L.A.

- Oxykel es una Oxitetraciclina de amplio espectro y larga acción.
- El producto de primera elección para los procesos de metafilaxia en el corral de engorda.



PRESENTACIÓN:

Frasco de 100 ml y 500 ml

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-014



Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos



ANTIMICROBIANOS

OXYKEL 20 L.A.

Solución inyectable de uso veterinario

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HCl) **200 mg**
Vehículo c.b.p. **1 ml**

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteínas en los organismos susceptibles. Se difunden a través de la membrana celular por transporte activo, una vez dentro de la célula, se unen irreversiblemente a los receptores en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, interfieren con la unión del aminoacil-ARN de transferencia con el sitio aceptor en el complejo ribosoma ARN mensajero. Esto impide la adición de aminoácidos a la cadena peptídica de alargamiento y la síntesis de proteínas. Su espectro de acción incluye bacterias Gram negativas como *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*, (*Haemophilus somnus*) *Haemophilus parasuis*; y *Fusobacterium necrophorum*. Algunas bacterias Gram positivas como *Trueperella (Arcanobacterium/Corynebacterium) pyogenes*.

INDICACIONES:

Está indicado contra las infecciones causadas por agentes microbianos (bacterias y rickettsias) sensibles a la Oxitetraciclina.

Bovinos:

Para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio como Neumonía de los terneros y Fiebre de embarque. Tratamiento de Endometritis postparto, Piometra y Pododermatitis (Necrobacilosis interdigital) Para el tratamiento de Anaplasmosis en bovinos expuestos a parásitos externos (garrapatas y moscas).

Porcinos:

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias como Neumonía Enzootica, Rinitis Atrófica, Pasteurellosis Neumónica causada por *Pasteurella multocida*, Poliserositis causada por *Haemophilus parasuis*. Para el tratamiento de la Endometritis postparto y Síndrome de Mastitis Metritis Agalactia en cerdas.

Ovinos y caprinos:

Para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, el Aborto Enzootico causado por *Chlamydia spp.*

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar 1 ml/ 10 kg (20 mg de Oxitetraciclina) vía IM profunda y repetir a las 72 horas si es necesario. Máximo 25 ml por sitio de aplicación.

TIEMPO DE RETIRO:

Bovinos y porcinos

• Carne : **21 días**

Bovinos

• Leche : **7 días**

Ovinos y caprinos

• Carne : **14 días**

• Leche : **4.5 días**

ADVERTENCIAS:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro sitio.

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx
@kelaamericas