

เจนต้า 50

Genta 50



ยาปฏิชีวนะแบบนีดเซนิดน้ำ


ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร



เจนต้ามัยซิน ชัลเฟต เทียบเท่ากับเจนต้ามัยซิน 50 มิลลิกรัม

Gentamycin sulphate eq to gentamycin 50 mg

- ✓ ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด
- ✓ ออกฤทธิ์วงกว้างทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและลบ
- ✓ ออกฤทธิ์รวดเร็ว
- ✓ มีฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียหากมีความเข้มข้นยาสูง
- ✓ มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหากมีความเข้มข้นยาต่ำ



เจนต้า 50

Genta 50



ยาปฏิชีวนะแบบฉีดชนิดเข晋าและกอน

ขนาดบรรจุ 100 มลลิลิตร

Gentamycin sulphate eq to gentamycin 50 mg



ข้อบ่งใช้

สำหรับสุนัข และแมว

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 - โรคติดเชื้อ E.Coli (Colibacillosis)
 - โรคติดเชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonellosis)
- ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ (Arthritis)
- ใช้รักษาโรคสายสะตืออักเสบ (Omphalitis)

สำหรับสุนัข และแมว

- ใช้รักษาโรคแผล และผิวหนังติดเชื้อ
- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- ใช้รักษาโรคหูอักเสบ (Otitis)
- ใช้รักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบ

ระยะเวลา :

สุกร โโค : หยุดยา ก่อนลุ่งโรงฟาร์เพื่อบริโภค 45 วัน

อายุสุนัข : 24 เดือนตามอายุทะเบียน (36 เดือนตามอายุสุนัข)

การเก็บรักษา :

เก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ให้พ้นแสง

ขนาดและวิธีการใช้

ชนิดของสัตว์	วิธีการใช้	ยัตราชาร์การใช้	ความถี่ในการใช้
สุกสว	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใต้ผิวหนัง เช้าเลี้นเลือดอย่างช้า ๆ	1 - 1.5 มล.ต่อน้ำหนัก 25 กก วันละ 2 ครั้ง ท่านกัน 12 ชั่วโมง หรือ ฉีดวันละครั้ง	เป็นเวลา 1 - 2 วัน
สุกร	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใต้ผิวหนัง เช้าเลี้นเลือดอย่างช้า ๆ	1 - 1.5 มล.ต่อน้ำหนัก 25 กก วันละ 2 ครั้ง ท่านกัน 12 ชั่วโมง หรือ ฉีดวันละครั้ง	เป็นเวลา 1 - 2 วัน
สุนัข แมว	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ใต้ผิวหนัง เช้าเลี้นเลือดอย่างช้า ๆ	1 มล.ต่อน้ำหนัก 12.5 กก วันละ 2 ครั้ง ท่านกัน 12 ชั่วโมง หรือ ฉีดวันละครั้ง	เป็นเวลา 4 - 7 วัน

