

# ອົກຊີໂຕເປີບ ທີບກໍ

Oxytocin Synth   

ຍອວົນລັບເຄະທີ່ຂັດຈິດ  
ຂາດບຣຈຸ 50 ມິລືລິຕົຣ



ອົກຊີໂຕເປີນ 10 I.U. ຕ່ວ 1 ມິລືລິຕົຣ

Oxytocin 10 I.U. per ml

- ✓ ກະຕຸນການບັບຕົວຂອງມຸດລູກຮ່ວງຄລອດແລະ ລັງຄລອດຊ່ວງແຮກ
- ✓ ຂ່າຍກະຕຸນການໄຫລຂອງນ້ຳນມ
- ✓ ດຸດເຊີມເວົ່າລັ່ງຜລກຮ່ວງຕຸນການບັບຕົວຂອງມຸດລູກແລະ  
ກະຕຸນການໄຫລຂອງນ້ຳນມກາຍໃນໄມ່ກື່ນເຖິ່ງລັງຈິດ



# ອົກຊື່ໂຕເຫັນ ຜິບກໍ

## Oxytocin Synth



ສອງໂມນເລີ້ນເຄຣາທີ່ຂັດໜຶດ

ຂະາດບຣາຈຸ 50 ມີລີລີຕີຣ

Oxytocin 10 I.U. per ml

ຂອບປ່ວໄຂ

ສໍາຫັນໂຄນມ

- ກະຕຸ້ນກາໄລຂອງນ້ຳນມ
  - ໄນເນີນນ້ຳນມທັງຄລອດໃນແນໂຄສາງ
  - ກະຕຸ້ນກາໄລຂອງນ້ຳນມຕົກຕ້າງທີ່ແລ້ວ  
(ສັນສົນກາຮັກຊາກຮົນເຕັ້ນມອັກເສບ)
- ປັບປຽງພັດນາກາຮອງມດລູກ
  - ກາວະຕຸກເລືອດທັງຄລອດ (Uterus atonia)
  - ຂ່າຍໄທມດລູກເຂົ້າໆ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສາພປກຕິເວົາຂັ້ນ
  - ຂ່າຍແກ້ປັ້ງທາກຕ້າງ (Secundinarum)

ສໍາຫັນສຸກ

- ກະຕຸ້ນໄທເພີ່ມຄວາມແຮງແລະຄວາມຖືຂອງການບັບຕົວຂອງມດລູກການຟ້າກາທົດຕັ້ງຂອງມດລູກອ່ອນແຮງ
- ກະຕຸ້ນກາໄລຂອງນ້ຳນມແລະໃຊ້ເສີມກາຮັກຊາກຮົນ ກາວະນ້ຳນມແທ້ງໃນແມ່ສຸກ (Mastitis Metritis Agalactia) (MMA)



ອົກຊື່ໂຕເຫັນເປັນຍອົງໂມນທີ່ອົກຖື້ນການບັບຕົວຂອງກລັມເນື້ອ  
ເຮັບຂອງມດລູກໂດຍຕຽງ ແລະຕ່ອຕ່ອມນ້ຳນມ ພລທີ່ຕາມມາເກືອ

- ເພີ່ມຄວາມຖື ແລະຄວາມແຮງຂອງກາທົດຕັ້ງຂອງມດລູກໃຫ້  
ຕອບສັນອອຍ່າງເຕີມທີ່ຮ່າງວ່າງຄລອດແລະຄວາມແຮງໃນການ  
ບັບຕົວຈະຄ່ອຍ ລົດລົງຫ່ວງທັງຄລອດ
  - ກະຕຸ້ນກາທົດຕັ້ງຂອງເຂລົລ Myoepithelial ທີ່ທຳຫັນທ້າທີ່ບັບຕົວ  
ໃຫ້ນ້ຳນມໄທລົງລົງສູ່ທ່ອນ້ຳນມ
- ກຣົນແມ່ສຸກຄລອດຍາກເນື້ອຈາກຄວາມມິດປົກຕິຂອງທ່າຄລອດລູກສຸກ  
ກາຣໃຊ້ອົກຊື່ໂຕເຫັນ ຂີ່ນ້ຳ ສາມາດໃຊ້ໄທຫັ້ງຈາກກາຮັກຊາກຮົນ  
ສມບູບດົນ

ຮະບະຫຼຸດຍາ : ໄນມໍຮະບະຫຼຸດຍາ

ອາຍຸລືັດັກ : 24 ເດືອນ

ກາຣເກີບຈັກຊາ : ເກີບໃນອຸນຫກງົມ 2 - 8 ອົງຄາເຂົລເຊີຍລ

: ເກີບໃຫ້ພັນແສງ

ຂະາດແລະວິທີກາໄຂ

ໜຶດຂອງລັດວົ	ວິທີກາໄຂ	ອັດຕາກາກາໄຂ
ໂຄນມ	ໜຶດເຂົ້າເລັ້ນເລືອດ	1 ມີລີລີຕີຣ / ໂຄນມ
	ໜຶດເຂົ້າກລັມເນື້ອ	3 - 6 ມີລີລີຕີຣ / ໂຄນມ
ສຸກ	ໜຶດເຂົ້າເລັ້ນເລືອດ	0.5 ມີລີລີຕີຣ / ແມ່ສຸກ
	ໜຶດເຂົ້າກລັມເນື້ອ	1 - 2 ມີລີລີຕີຣ / ແມ່ສຸກ

